

# CONCILIATION MEDICAMENTEUSE DE L'ADMISSION A LA SORTIE D'HOSPITALISATION DU PATIENT

Henry CH<sup>1</sup>, Michel B<sup>1,2</sup>, Paya D<sup>1</sup>, Andres E<sup>3</sup>, Gourieux B<sup>1</sup>. <sup>1</sup>Pharmacie – Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS), <sup>2</sup>Humanis – Université de Strasbourg, <sup>3</sup>Médecine interne – HUS

## CONTEXTE

Points de transition = admission, transfert, sortie d'hospitalisation ➔ Risque d'informations incomplètes ou mal communiquées entre les professionnels de santé (interface ville-hôpital) ➔ Survenue d'erreurs médicamenteuses (EM) ➔ **Intérêt de la conciliation médicamenteuse !**

## OBJECTIF


Assurer une conciliation médicamenteuse couvrant l'ensemble du parcours-patient de la pré- à la post-hospitalisation immédiate & détecter des EM aux points de transition

## PATIENTS & METHODES

- **Patients** : âge ≥ 65 ans & hospitalisés en médecine interne après passage au service des urgences
- **Conciliation médicamenteuse** : comparaison entre le traitement ambulatoire optimisé de pré-hospitalisation, l'ordonnance d'admission, du dernier jour d'hospitalisation et le traitement de sortie
- **Détection de divergences** : intentionnelles (DI) = écarts de prescription / non intentionnelles (DNI) = EM
- **Appel téléphonique au domicile / à la maison de retraite** : 2-3 semaines après la sortie



## RESULTATS

- **Patients** : n = 30 – âge moyen = 80,8 ans – durée d'hospitalisation moyenne = 16,1 jours



- **Ordonnance de sortie** : 60,3% des médicaments ambulatoires de pré-hospitalisation sont poursuivis, 19% sont modifiés et 20,7% sont arrêtés

## CONCLUSION

		Axes d'amélioration
- Approche complète du parcours-patient - DNI corrigées à l'admission donc très faible nombre de DNI à la sortie	- DI à la sortie = défaut d'information des lettres de sortie - EM générées par les patients après la sortie par non-intégration des modifications de traitement	- <b>Admission</b> : accès facilité au dossier pharmaceutique informatisé - <b>Sortie</b> : mise en place d'une consultation pharmaceutique - <b>Toutes les étapes</b> : développement de la conciliation en routine afin de limiter les EM aux points de transition