

Contexte


En France, 600 000 personnes par an sont traitées par anti-vitamine K. Ces médicaments sont porteurs d'effets iatrogènes et responsables d'hospitalisations au caractère bien souvent évitable.

Objectifs


Notre objectif est de promouvoir l'éducation santé dispensé aux patients par les médecins et les infirmières.

Matériels et méthode:

Gestion des risques



Audit Interne de 3mois



Unités de soins:
Cardiologie
Chirurgie Orthopédique,
Neurologie et Gériatrie

Résultats

Audit de connaissance des IDE et des internes

■ Connaissance ■ Méconnaissance

INR cible

88%

12%

Interactions
médicamenteuses

87%

13%

Interactions
alimentaires

53%

37%

68% des IDE
83% des Internes

• Pratiquent
l'éducation santé

100%des IDE
100% des Internes

• Soulignent un
manque de
support pour
l'éducation santé

Conclusion

La pharmacie a mis en place des outils d'aide à l'éducation santé tels que : diaporama d'éducation, questionnaire d'évaluation des connaissances du patient, fiche de liaison hôpital -ville attestant des acquis du patient. Le pharmacien intègre le tandem médecin- IDE pour éduquer les patients sous AVK.

Bibliographie

Vieillesse : les données biologiques Denis F, Veyssier P, Elsevier éditions, Paris, 2005
Mise au point : prévenir la iatrogénie médicamenteuse chez le sujet âgé ; ANSM, juin 2005