

# Etat des lieux des prescriptions de psychotropes dans un centre hospitalier de soins de suite et de réadaptation

F. Bel (1) ; E. Carré (1) ; B. Falquet (1) ; S. Emery (1) ; F. Costaz (2) ; J. Luaute (3) ; G. Rode (3) ; C. Rioufol (1)  
 (1) Pharmacie, Hôpital Henry Gabrielle, Groupement Hospitalier Sud, HCL, Pierre-Bénite;  
 (2) Direction qualité, Groupement Hospitalier Sud, HC L, Pierre-Bénite;  
 (3) Médecine physique et réadaptation, Hôpital Henry Gabrielle, Saint-Genis-Laval

## Introduction

Les psychotropes sont fréquemment prescrits en établissement de soins de suite et de réadaptation (SSR). Ils représentent des molécules à risque, surtout chez ces patients polymédiqués dont les besoins en vigilance sont accrus du fait de leur rééducation.

Objectifs :

- évaluer l'importance et la qualité des prescriptions de psychotropes dans un établissement de SSR de 175 lits,
- améliorer leurs conditions de prescription.

## Patients et méthodes

- Enquête réalisée un jour donné
- Dans 7 services d'hospitalisation
- Grille de recueil validée par les médecins
- Recueil par 2 internes en pharmacie, 1 étudiant et le pharmacien sénior
- Saisie et analyse des données avec le logiciel Etnos
- Recommandations utilisées : Vidal, ANSM, HAS et SOFMER (Société Française de Médecine Physique et de Réadaptation).

Pharmacie hôpital Henry Gabrielle GHS		Audit psychotropes 2014		Date de rampe : / /					
Patient		MOT d'hospitalisation		FOR		Avis psy		Nb total de jours de traitement	
Nom		<input type="checkbox"/> Pathologie psychiatrique	<input type="checkbox"/> Age > 80	<input type="checkbox"/> Age > 80	<input type="checkbox"/> M. (DPO +	<input type="checkbox"/> M. (DPO +	<input type="checkbox"/> M. (DPO +	<input type="checkbox"/> M. (DPO +	<input type="checkbox"/> M. (DPO +
Age	ans	<input type="checkbox"/> Averse cérébrale (VTC, TC, BEP, autres)	<input type="checkbox"/> Averse cérébrale (VTC, TC, BEP, autres)	<input type="checkbox"/> Averse cérébrale (VTC, TC, BEP, autres)	<input type="checkbox"/> Averse cérébrale (VTC, TC, BEP, autres)	<input type="checkbox"/> Averse cérébrale (VTC, TC, BEP, autres)	<input type="checkbox"/> Averse cérébrale (VTC, TC, BEP, autres)	<input type="checkbox"/> Averse cérébrale (VTC, TC, BEP, autres)	<input type="checkbox"/> Averse cérébrale (VTC, TC, BEP, autres)
Sexe	M / F	<input type="checkbox"/> Averse émotionnelle (PAN, neuropathie)	<input type="checkbox"/> Averse émotionnelle (PAN, neuropathie)	<input type="checkbox"/> Averse émotionnelle (PAN, neuropathie)	<input type="checkbox"/> Averse émotionnelle (PAN, neuropathie)	<input type="checkbox"/> Averse émotionnelle (PAN, neuropathie)	<input type="checkbox"/> Averse émotionnelle (PAN, neuropathie)	<input type="checkbox"/> Averse émotionnelle (PAN, neuropathie)	<input type="checkbox"/> Averse émotionnelle (PAN, neuropathie)
Service		<input type="checkbox"/> Pathologie associée	<input type="checkbox"/> Pathologie associée	<input type="checkbox"/> Pathologie associée	<input type="checkbox"/> Pathologie associée	<input type="checkbox"/> Pathologie associée	<input type="checkbox"/> Pathologie associée	<input type="checkbox"/> Pathologie associée	<input type="checkbox"/> Pathologie associée
Durée du séjour	jours								

Molécule	Pose	Hor	Durée	Pose	Pose	Indication	Indication	Indication	Indication	Indication	Indication	Indication	Indication	Indication	Indication	Indication	Indication
BERESTA	mg	NON	10J	DOU	DOU	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique
XANAX	mg	NON	10J	DOU	DOU	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique
LEVOMEL	mg	NON	10J	DOU	DOU	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique
VALIUM	mg	NON	10J	DOU	DOU	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique
URBANYL	mg	NON	10J	DOU	DOU	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique
TRANIENE	mg	NON	10J	DOU	DOU	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique	<input type="checkbox"/> Anxiolytique

## Résultats



Sur les 150 patients hospitalisés → 116 ont au moins 1 psychotrope, 1/3 a bénéficié d'une consultation avec le psychiatre sur l'hôpital. Le nombre moyen de psychotropes par patient est de 2,3.

Sur ces 116 patients :

→ 17 non-conformités (indications hors AMM, mauvais plan de prise, posologie trop élevée), mais 65% validées par psychiatres ou neurologues.

→ 15 durées de prescription d'anxiolytique ou d'hypnotique > 6 mois (dont 67% avec avis du psychiatre et 27% avec pathologie psychiatrique antérieure).

→ 16 ont + de 4 psychotropes (dont 88% avec avis du psychiatre et 50% avec pathologie psychiatrique antérieure).



## Discussion

Les résultats de cette enquête ont été discutés avec les médecins séniors.

Principales pistes d'amélioration :

- rappel des recommandations avec sensibilisation des internes en début de semestre,
- précision systématique de la durée de prescription pour les anxiolytiques et les hypnotiques,
- prescription limitée à 4 psychotropes,
- réévaluation,
- travail collaboratif avec le psychiatre pour les situations les plus complexes.