

Bon usage des neuroleptiques chez les patients Alzheimer ou apparentés: après les EHPAD, une seconde évaluation des pratiques professionnelles en soins de suite et médecine gériatrique

J. Robert¹ ; L. Paineau² ; A. Babinet¹ ; A. Lisfi¹ ; E. Lemasne¹ ; M. Corvaisier¹ ; S. Magne¹ ; J. Teil¹
 1 - PUI, centre hospitalier de Saumur; 2 - Soins de suite, centre hospitalier de Saumur



INTRODUCTION ET OBJECTIF



Plan Alzheimer (2008-2012)


« Améliorer la qualité des pratiques et l'utilisation des médicaments psychotropes dans cette maladie »



Au sein du CH Saumur :
 EPP n° 1: centrée sur les EHPAD = longs séjours
 EPP n° 2: centrée sur les Soins de Suite (SSR) et la gériatrie (MPG) = soins aigus


L'objectif est de comparer ces deux EPP

MATÉRIELS ET MÉTHODES



RÉSULTATS

Pourcentages de réponses positives aux critères



DISCUSSION

EHPAD

=> cliniciens extérieurs, moins familiarisés à :

- la recherche de causes somatiques **3**
- la traçabilité de l'évaluation du rapport B/R dans le dossier patient **5**

=> sensibilisation des cliniciens sur ces deux points

Indicateurs d'alerte calculés :

- semblables et correspondant à la moyenne nationale.

Des biais peuvent subsister :

- biais de mesure, lié à la subjectivité des auditeurs (n=3)
- biais de sélection: longs séjours (EHPAD) vs soins aigus (MPG)