

Evaluation de l'observance du mycophénolate mofétil en pédiatrie



N. Hasni¹, K. Ben Jeddou¹, F. Mouakher¹, N. Wahbi¹, D. Edriss¹, M. Khrouf², Z. Ouahchi¹, T. Gargah³

¹Service de pharmacie, EPS Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

²Service de pharmacie, Centre de greffe de la moelle osseuse, Tunis, Tunisie

³Service de pédiatrie, EPS Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

1 INTRODUCTION

L'observance thérapeutique influe aussi bien la qualité de la prise en charge du patient que le processus de la rémission. En pédiatrie et essentiellement pour les médicaments à marge thérapeutique étroite, l'adhérence au traitement est cruciale.

L'objectif de notre étude est l'évaluation de l'observance du mycophénolate mofétil (MMF) en pédiatrie et détermination des facteurs qui l'influencent.

2 PATIENTS ET METHODES

Il s'agit d'une étude prospective réalisée sur 3 mois au service de pédiatrie. L'observance est évaluée par entretien avec les patients hospitalisés ou venus en consultation par des internes en pharmacie grâce à un questionnaire standardisé. Les déterminants de l'observance: âge, ancienneté du traitement, nombre de prises par jour, nombre de médicaments... ont été collectés pour chaque patient.

3 RESULTATS

- 41 patients inclus dans cette étude
- Sexe ratio G/F: 1,15
- la médiane des âges: 11 ans
- 78% des patients bénéficient d'une couverture sociale
- Chaque prescription comprend en moyenne 4 médicaments




Figure 1: Ancienneté du traitement




Figure 2: Gestion du traitement




Figure 3: Evaluation de l'observance




Figure 4: Les causes de la non observance

L'analyse statistique n'a pas démontrée de corrélation significative entre les différents déterminants de l'observance et la qualité de l'adhérence au traitement

4 CONCLUSION

Cette étude a permis de déceler un taux élevé de non observance en pédiatrie. Plusieurs paramètres liés au patient, au médicament et aux professionnels de santé peuvent expliquer cette mauvaise observance. Pour y remédier, l'instauration d'un programme d'éducation thérapeutique multidisciplinaire semble être incontournable.