

Switch Buprénorphine-Suboxone en maison d'arrêt : Bilan à 3 mois




A.Prigent, S.Taurin, G.Bertoliatti, A.Sabri, I.Tiret, R.Varin, B.Dieu
Service de la pharmacie, Centre hospitalo-universitaire de Rouen, France

Introduction : De nombreuses études mettent en évidence le mésusage des traitements de substitution aux opiacés en milieu carcéral. La buprénorphine (BHD) lors d'un usage détourné présente des effets comparables à ceux de l'héroïne, qui la rend source de trafic. En utilisant le Suboxone (SBX) qui associe la BHD et la naloxone (NLX) ce mésusage est limité car un syndrome de manque apparaît en cas d'une administration autre que la voie sublinguale. En concertation avec l'équipe médicale, nous avons décidé d'accompagner le switch des patients traités par BHD vers le SBX au sein de l'unité somatique (US).

Objectifs : Evaluer les changements de pratiques observés suite à ce switch tant sur les modalités d'administration que sur les adaptations posologiques.


Matériels et méthodes :



Résultats :


- 1 41 % de questionnaires retournés
- 2 Diminution de 29,5% du mésusage après 3 mois sous SBX
- 3 Réduction de 1,9 mg de la posologie de BHD après 3 mois sous SBX
- 4 Persistance de la consommation de BHD chez 9 patients malgré l'arrêt de délivrance à l'US
- 5 66 % consomment également d'autres produits illicites en association au SBX (cannabis, cocaïne, héroïne)
- 6 75 % des patients n'apprécient pas le goût citron du SBX sensé rendre la prise moins désagréable pour le patient

COMPARAISON BON USAGE/MÉSUSAGE SOUS BHD PUIS APRES 3 MOIS SOUS SBX



■ Bon usage (%) : prise une fois par jour en sublinguale
■ Mésusage (%) : plusieurs prises par jour autres que par la voie sublinguale

NOMBRE DE PATIENTS CONSOMMANT D'AUTRES PRODUITS ILLICITES AVEC LE SBX



Discussion :

- Amélioration globale des pratiques d'administration avec le SBX
- L'accompagnement médical reste un point clé dans la prise en charge de ces traitements
- Persistance d'un mésusage du SBX permettant de penser qu'il existe des moyens de contourner l'effet recherché par cette formulation comprenant de la NLX
- Nécessité de réaliser une étude sur les consommations d'autres médicaments mésusés (benzodiazépines, tramadol, divers opiacés) avec le SBX en milieu carcéral